

Bezkręgowce



Monika Lubecka 6b

Latolistek cytrynek



- Latolistek cytrynek zimuje w postaci dorosłej. Chłodne miesiące przeczekuje w dziuplach, zaroślach lub opadłych liściach. Motyl zapada wówczas w stan, który w dużym uproszczeniu można nazwać zimowym snem. Metabolizm motyla spowalnia, co pozwala mu oszczędzać energię i przetrwać do wiosny.



Trzmiel ziemny

- Pomimo skłonności do żerowania w otwartym krajobrazie, trzmiel ziemny bez problemu mogą przelatywać nawet 600 m w głąb lasu, aby znaleźć odpowiednie zasoby nektaru. Trzmiel ziemny żywi się nektarem kwiatów. Jest jednym z najbardziej wszechstronnych gatunków – odwiedza ponad 500 gatunków roślin.



Nasosznik trzęś

- Gdy pająk wyczuje zagrożenie, zaczyna się kołysać, wprawiając swoją sieć w tak szybkie drgania, że staje się niemal niewidoczny. Nasosznik znany jest też z tego, że lubi napadać na sąsiadów. Wchodzi na sieci innych pająków, a jeśli uda mu się pożywić gospodarzem, to korzysta też z jego sieci.



Karaczan

- Głowa jest u niego prawie całkowicie ukryta pod silnie rozwiniętym przedpleczem, z tego powodu nazywany jest hełmcem. Należy do owadów, u których występuje przeobrażenie niezupełne, tj. ich formy młodociane są podobne do organizmów dojrzałych.



Komarnica błotniarka

- Szkodnik żyjący w wilgotnych glebach, podgryzający korzenie roślin. Szkody wyrządzają larwy, które w nocy żerują na naziemnych częściach młodych roślin.

Dziękuję za uwagę



- Zdjęcia własne i z internetu:

[https://www.wigry.org.pl/glowne/bezkregowce.
htm](https://www.wigry.org.pl/glowne/bezkregowce.htm)